

## 管内で牛のサルモネラ症発生！

管内でサルモネラ・ダブリンによる牛のサルモネラ症の発生がありました。  
衛生管理を徹底し、本病の侵入防止に努めましょう。

### ◆ 牛のサルモネラ症の主な症状 ◆

- ①発熱（40℃前後）
- ②下痢・軟便（時に血便）
- ③食欲不振、乳量激減
- ④呼吸器症状、流産など

こんな症状を  
発見したら、  
すぐに獣医師  
に連絡を！

### ◆ 正しい知識でサルモネラ症を予防しましょう ◆

サルモネラは、サルモネラが口から入ることで感染  
→ 感染した牛から、多量のサルモネラが糞便と共に排出され、飼養環境を汚染  
→ サルモネラが別の牛の口に入り感染が拡大

以下のポイントに注意して発生を予防しましょう。



#### 侵入防止

- ・来場者の車両消毒、牛舎ごとに踏込消毒槽を設置
- ・野生動物や野鳥の侵入防止(防鳥ネット等の利用)
- ・導入牛の一定期間の隔離・観察



#### 感染拡大防止

- ・牛舎の定期的な清掃・消毒(飼槽・水槽は特に念入りに！)
- ・異常牛の早期発見・隔離
- ・ストレスを与えない飼養管理